



SANTÉ-ANIMALE

1. Route de Rosel, SAINT-CONTEST - 14053 CAEN CEDEX 4

Téléphone: 02-31-47-19-19

Fax: 02-31-47-19-49 Immuno-Hémato-Biochimie-Virologie Fax: 02-31-47-19-42 Autopsie-Bactériologie-Parasitologie

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

ECURIE DES AGRIFRS MME IMBERT LAURE LES AGRIERS

16300 ST PALAIS DU NE

MADAME DEPECKER MARIANNE DOCTEUR VETERINAIRE CLINIQUE EQUINE DE CONQUES 3 CHATEAU DE CONQUES 33420 ST AUBIN DE BRANNE

Numéro d'ordre : 21391

Motif: DIAGNOSTIC

Identification du cheval (Horse's identity) :

Nom (Name)

: BELTZ

Espèce (Species) : Equine

N° de SIRE (French Immatriculation Number) : N° UELN (UELN number)

Race (Breed) Sexe (Sex)

N° de Transpondeur (Microchip)

Date de prélèvement (Sampling date)

Date de réception (Reception date) : 12/05/2022

Date début d'analyse (analysis starting date) : 12/05/2022

Sérodiagnostic / Serodiagnosis

		Sérum Se <i>rum</i> S.2022.31063-2-1
Gourme (Streptococcus equi subsp equi) Strangle Matrice analytique/Analytical Sample :Sérum	Antigène AgA Méthode ELISA / STRANGLE ELISA KIT AHT Seuil positif/Positive cut off: 0.5 Seuil douteux/Doubtful cut off: 0.3	POSITIF POSITIVE 0.6
	Antigène AgC Méthode ELISA / STRANGLE ELISA KIT AHT Seuil positif/Positive cut off: 0,5 Seuil douteux/Doubtful cut off: 0,3	DOUTEUX DOUBTFUL 0.3

Informations:

Pour un premier prélèvement, un résultat « Douteux » signale soit une phase précoce de séroconversion, soit une réaction croisée, soit un taux résiduel d'anticorps.

Un second prélèvement réalisé à un intervalle de 15 jours minimum du premier est fortement conseillé.

S'il s'agit d'un second prélèvement effectué au minimum 15 jours après le premier, un statut « Douteux » stable confirme l'existence d'une réaction

Ce résultat ne constitue pas un diagnostic à part entière. Il met en évidence le statut sérologique de l'animal vis-à-vis de Gourme (Streptococcus equi subsp equi).

Observation(s) éventuelle(s) (Remarks) :

Afin d'améliorer les outils de détection et de prévention au service de la santé de votre cheval ; en l'absence d'une information contraire de votre part, dans le cadre de ses travaux de recherche et développement, LABÉO peut être amené à utiliser de façon anonyme le reliquat de l'échantillon adressé.