CLINIQUE EQUINE DE CONQUES

3, Château de Conques 33420 Saint Aubin de Branne

05.57.74.94.21

contact@cliniquedeconques.com | www.cliniquedeconques.com

Dr Guillaume BON
Ancien interne, Université de Montréal

Dr Nerea ECHEBERRIA
Ancienne interne, Universitad Alfonso X El Sabio

Dr Jean-Michel CASAMATTA
Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

Dr Mathieu LENORMAND
Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

Dr Marianne DEPECKER
Médecine interne, PhD, Dipl. ECEIM

Dr Fabien RELAVE
Chirurgien équin, Dipl. ACVS & ECVS

FERIA DE LUTI
N° Puce : 250259806149033
Age : 8 ans et 1 mois / Poids : 532 kg
Espèce : Cheval
Race : ANGLO ARABE
Sexe : F
Propriétaire : Mme IMBERT LAURE

Mme IMBERT LAURE
ECURIES DES AGRIERS
16300 ST PALAIS DU NE

le 23/06/2023

Dr Mathieu LENORMAND
N° national d'inscription : 18357

Motif

Commémoratifs

FERIA est présentée pour une boiterie de l'AD apparue plusieurs semaines auparavant (3).
Une anesthésie digitée proximale est réalisée par le DR BAUDIN, la boiterie a été améliorée mais l'examen radiographique n'a pas permis de constater d'anomalie significative.

Une échographie est souhaitée.

Description

L'examen statique ne permet pas de constater d'anomalie significative.

L'examen dynamique permet de noter l'absence de boiterie en ligne droite, une irrégularité de l'AD à main gauche uniquement sur le cercle dur.
La locomotion est améliorée sur le terrain mou.

Le test de flexion de l'AG engendre un test d'appui de l'AD.
Le test de flexion de l'AD engendre une raideur.

L'examen d'imagerie médicale permet de constater :
- au niveau du pied AD, absence d'anomalie radiographique. Aplomb avec angle phalangien inversé. Bursite podotrochléaire. Absence d'anomalie ligamentaire ou tendineuse
- au niveau de la région métacarpienne, absence d'anomalie ligamentaire ou tendineuse.

La jument est réexaminée après l'imagerie et sans fer D. La boiterie est visible dans les mêmes circonstances mais augmentées.

Une anesthésie digitée distale interne est alors réalisée, elle permet de faire disparaître la boiterie.

L'examen de ce jour est donc en faveur d'une douleur en région interne du pied AD. Une bleime ou un abcès sont des hypothèses probables.
Une surcharge locale est également envisageable.

Conclusions

Douleur en interne du pied AD