



CLINIQUE EQUINE DE CONQUES

3, Château de Conques 33420 Saint Aubin de Branne

05.57.74.94.21

contact@cliniquedeconques.com | www.cliniquedeconques.com



Dr Guillaume BON

Ancien interne, Université de Montréal

Dr Nerea ECHEBERRIA

Ancienne interne, Universidad Alfonso X El Sabio

Dr Jean-Michel CASAMATTA

Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

Dr Mathieu LENORMAND

Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

Dr Marianne DEPECKER

Médecine interne, PhD, Dipl. ECEIM

Dr Fabien RELAVE

Chirurgien équin, Dipl. ACVS & ECVS

FERIA DE LUTI

N° Puce : 250259806149033

N° SIRE : 15 185 209 M

Age : 8 ans et 1 mois / Poids : 532 kg

Espèce : Cheval

Race : ANGLO ARABE

Sexe : F

Non destiné à la production alimentaire

Mme IMBERT LAURE

ECURIES DES AGRIERS

16300 ST PALAIS DU NE

France

Dr Mathieu LENORMAND

Ancien interne de l'Ecole Vétérinaire de Lyon

mlenormand@cliniquedeconques.com

N° national d'inscription : 18357

ordonnance n°23-06-0665[C]

le 23/06/2023

1 - EQUIPALAZONE 1 SACHET

Non délivré à ce jour **Qté : 15**

Substance(s) active(s) / Sachet : Phénylbutazone 1 g

Forme pharmaceutique : Poudre orale

Pathologie :

Posologie : Administrer par voie orale : 1 sachet matin et soir pendant 5 jours puis un sachet une fois par jour pendant 5 jours (commencer ce soir)

Délai d'attente : Dopage : 14 jours. Exclusion définitive de la consommation humaine. A inscrire sur le livret et sur le site IFCE.

Cascade non requise

Commentaires : NE REALISER LE TRAITEMENT QU APRES PASSAGE DE VOTRE MARECHAL

Localement mettre le membre sous cataplasme avant de le présenter à votre maréchal.

FERRURE des antérieurs :

Garder un parage court dans l'aplomb, ferrer au moyen de fers légers avec un bon relevé de pince et un bon rolling en rive externe.

Adjoindre des oignons portant au sol.

Au niveau du pied AG, on observe également une surcharge en interne. Corriger le parage de manière à mieux équilibrer les pressions. Au niveau du parage général compte tenu de l'absence de talons, parer principalement en pince et peu voir pas en talons.

ACTIVITE

Garder FERRI Au repos au box ou au petit paddock avec marche au pas uniquement en main ou montée et ce jusqu'à 5 jours après l'arrêt du traitement au moyen de l'Equipalazone.

En cas de persistance des troubles, un contrôle est recommandé. Une infiltration de la bourse et/ou un traitement au moyen d'un biphosphonate serait alors indiquée.

Un IRM serait un examen complémentaire de choix.

Cette prescription concerne le cheval désigné et ne doit en aucun cas être appliqué à un autre.

Les délais d'attente et de dopage indiqués sont approximatifs. Seule une analyse de dépistage peut permettre de vérifier l'absence effective de trace.

Le cheval a potentiellement reçu des substances l'excluant temporairement ou définitivement de la consommation humaine. Le cas échéant nous contacter pour plus d'informations.