

CLINIQUE EQUINE DE CONQUES

3. Château de Conques 33420 Saint Aubin de Branne 05.57.74.94.21



contact@cliniquedeconques.com | www.cliniquedeconques.com

Guillaume BON Docteur vétérinaire

Docteur vétérinaire Ancien interne Ancien interne Université de Montréal Ecole Vétérinaire de Lyon

Jean-Michel CASAMATTA

Marianne DEPECKER Docteur vétérinaire Médecine interne PhD, Dipl. ECEIM

Mathieu LENORMAND Docteur vétérinaire Ancien interne Ecole Vétérinaire de Lyon

Mme IMBERT LAURE

ECURIES DES AGRIERS

16300 ST PALAIS DU NE

Fabien RELAVE Docteur vétérinaire Chirurgien équin Dipl. ACVS & ECVS

SHIMAKH AL NAIF

N° Puce: 985 000 634 001 625 Age: 15 ans et 11 mois Espèce: Cheval

Race: PUR SANG ARABE

Sexe: M

Propriétaire: Mme IMBERT LAURE

Compte-rendu d'hospitalisation coliques

le 14/01/2022

Dr Mathieu LENORMAND

N° national d'inscription: 18357

Motif

Coliques

Commémoratifs

SHIMAKH a été référé le 12/01/2022 à 20h00 par le Dr BAUDIN pour des coliques évoluant depuis l'après midi. Malgré les soins initiaux prodiqués, l'évolution a été négative et SHIMAKH a été hospitalisé en urgence.

SHIMAKH est un cheval tiqueur à l'appui.

Description

Examen à l'admission

- Clinique, douleur modérée
- Palpation transrectale, distension gazeuse du colon et de l'intestin grêle.
- Echographies abdominales transcutanée et transrectale, absence d'intestin grêle visible
- Paramètres sanguins, bons
- Paracentèse, réaliser pour discriminer un éventuel foramen épiploique non encore objectivable échographiquement, lactates normaux et ce par deux fois
- Intubation naso-gastrique, absence de reflux.

Soins initiaux

Mise sous perfusion de fluides et de sédatifs/analgésiques.

Administration de laxatifs suite à l'apparition d'une impaction de la courbure pelvienne une fois la distension gazeuse résolue.

Chirurgie

Sans Objet

<u>Suivi</u>

ALIMENTATION:

Actuellement, SHIMAKH reçoit la totalité de sa ration de foin à volonté. Continuer ainsi. Un cheval doit au minimum manger 1.5 kgMS de

fourrage/100 kg de poids vif soit au minimum 9 kg de foin et idéalement 10-12 kg pour 500-600 kg.

Idéalement mettre le cheval à l'herbe ou à défaut au box sur copeaux, s'il reste sur paille, veiller à ce que le box soit fait tous les jours afin d'éviter qu'il ne se bourre de paille.

Donner du son ou un mash à 2 reprises, dans la semaine.

Réintroduire les concentrés progressivement, en adoptant une ration de repos.

Nous vous conseillons fortement d'administrer le fourrage avant les granulés et de distribuer les aliments (fourrages compris) à plusieurs reprises dans la journée.

ACTIVITE:

Reprendre une activité montée progressivement ou le laisser au pré le cas échéant.

SOINS/SURVEILLANCE:

- Prendre la température 1 fois par jour pendant 10 jours.
- Surveiller le transit (les crottins normaux en quantité et qualité) ainsi que l'appétit et la prise de boisson.

Conclusions

Distension gazeuse sévère et impaction résolues médicalement.

